


RECUERDE:

- El catéter es una canalización venosa mediante una sonda flexible de silicona, o material similar, insertada debajo de la piel por la cual podemos realizar los tratamientos de hemodiálisis.



- El buen funcionamiento de su catéter contribuye a los buenos resultados de su tratamiento.
- Su catéter es de uso EXCLUSIVO para hemodiálisis.



Ante cualquier duda consúltenos
por teléfono

o

email:

enf.hmdl.hcu@salud.aragon.es

Guía práctica para cuidadores y enfermos
portadores de catéter

UNIDAD DE DIÁLISIS
(Servicio de Nefrología)

Guía de Información al Paciente

- También puede consultar o asesorarse en la Asociación de Enfermos Renales Alcer Ebro
TF:976359001
<http://www.alcerebro.org/>



CONTACTO :

SERVICIO DE NEFROLOGÍA:

Unidad de Diálisis: 976 765700
Extensión 161901

Hospital Clínico Universitario
"Lozano Blesa"
www.hcuz.es

Avda. San Juan Bosco, 15
50009 Zaragoza



¿Qué es la hemodiálisis?

Es un tratamiento empleado en la insuficiencia renal crónica con el que se depura la sangre y se eliminan los líquidos sobrantes del organismo



¿Qué debe hacer antes de la colocación de su catéter?

- Adecuada higiene corporal.
- Retirar objetos metálicos (pulseras, joyería, relojes, etc.).
- Informar de la medicación que tome y alergias.
- Leer y firmar si procede los consentimientos informados.
- Consultar cualquier duda con el personal de la planta o Unidad de Diálisis.
- Seguir las recomendaciones de todo el equipo.

¿Qué debe hacer después de la colocación de su catéter?

- Después de cada sesión de hemodiálisis, su enfermera dejará limpio y cerrado su catéter. Debe mantenerlo así hasta su próxima sesión.
- Debe de tener en su domicilio el material necesario para cambiar su apósito si fuera preciso. Para ello deberá usar mascarilla, lavado de manos y guantes, tal como lo hace su enfermera. No almacenará material.
- Mantenga una buena higiene corporal. Utilice con cuidado la ducha de teléfono a fin de no mojar el apósito. La humedad es fuente frecuente de infecciones. En caso de humedad cambie el apósito.
- No toque los tapones ni las pinzas. Podría haber riesgo de sangrado, infección o entrada de aire.
- No dé tirones ni golpes a su catéter.

Complicaciones frecuentes

• Infección

Es la más frecuente. La manera de evitarla es una correcta higiene (usando mascarilla, lavado de manos, uso de guantes estériles, etc.) y evitar su manipulación.

• *Signos de infección tempranos:*

- Enrojecimiento de la zona.
- Tumefacción.
- Aumento de la temperatura local.
- Puede haber fiebre, escalofríos, malestar general, sangrado, serosidad o pus.

• *Signos de infección tardíos:*

- Los signos y síntomas de infección, se pueden reducir a supuración, sangrado.

• Sangrado en los puntos de inserción del catéter

Si esto ocurre, deberá taponar con gasas y acudir a su médico.

• Taponamiento (coagulación)

Su equipo de enfermeras y médicos administrarán los tratamientos adecuados para poder solucionarlo.